

# 経口妊娠中絶「メフィーゴ®パック」を受けられる方へ

※使用できるのは妊娠9週0日以下の方となります

## ☆中絶薬のメリットとデメリット

- メリット**： 身体の負担が少ない。
- デメリット**： 妊娠9週0日以下までしか適用できません。成功率は約93%です。内服してから、中絶までに2~3日かかります。内服は2種類あり、2錠目内服後は入院管理となり、胎嚢が排出されるまで入院となります。内服しても、手術が必要となる場合があります。



## ☆薬の使用方法和スケジュール

### ◎1錠目（錠剤1つ）を服用

確認のもとで1錠目（錠剤1つ）を服用します。

### ◎2錠目（錠剤4つ）を服用

36~48時間後に再度来院し、確認のもとで2錠目（錠剤4つ）を服用します。

左右の歯茎と頬の間に2錠ずつはさみ、唾液でゆっくりと30分間溶かします。

30分後に錠剤が残っている場合は水と一緒に飲み込みます。

### ◎胎嚢が排出されるまで院内待機

多くの場合2錠目の服用後、4時間以内に子宮出血が始まります。

胎嚢が排出されるまで院内待機となります。胎嚢排出確認後、


3~4時間で異常がなければ診察後、帰宅することができます。

### ◎超音波検査で中絶の確認

胎嚢排出後、人工妊娠中絶に至ったことを超音波検査にて確認します。

胎嚢排出されなかった場合には外科的な処置を行う場合があります。

### ◎1週間後診察



## ☆費用について ※詳しくはお問い合わせください。

初期検査代・経口妊娠中絶薬代

(費用が追加になる場合)

胎嚢が排出されず手術が必要になった場合・病院に1泊する場合（部屋、食事代等）

## ☆持ち物・注意事項について

来院時にスタッフより詳しくご説明いたします。

お問合せ もりレディースクラブクリニック (0584) 74-1888 ガイダンス③または①